

## היחידה לנורולוגיה של הילד והמתבגר מנהלת - פרופ' ברוריה בן זאב

# בוקולאם

התרופה מיועדת להפסקת התקפים אפילפטיים ממושכים בגילאי 3 חודשים עד 18 שנים. בתינוקות בגילאי 3-6 חודשים הטיפול בבוקולאם יינתן בתחומי בית החולים בלבד!

### לפני השימוש בתרופה:

לבוקולאם יש אינטרקציה עם תרופות מסויימות לכן יש להתייעץ עם רופא לגבי שימוש בבוקולאם יחד עם התרופות הקבועות.

### מינונים:

ישנם 4 מינונים שונים, הרופא ייקבע את המינון שמתאים לילדך. יש לשים לב שככל שהילד גדל ועולה במשקל יכול להיות שיצטרך בעתיד מינון גבוה יותר.


3 חודשים עד גיל שנה	- 2.5 מ"ג	- אריזה בעלת תווית צהובה
שנה ועד גיל 5 שנים	- 5 מ"ג	- אריזה בעלת תווית כחולה
5 שנים - 10 שנים	- 7.5 מ"ג	- אריזה בעלת תווית סגולה
10 שנים - 18 שנים	- 10 מ"ג	- אריזה בעלת תווית כתומה



### אופן השימוש:


#### שלב ראשון -

אחוז את שפופרת הפלסטיק, שבור את האוטם בצד אחד ושלוף את הפקק. הוצא את המזרק מחוץ לשפופרת.




### שלב שני -

שלוף את הפקק האדום מקצה המזרק והוצא אותו בזהירות




### שלב שלישי -

תוך כדי שימוש באצבע ובאגודל צבוט ומשוך בעדינות את לחיו של הילד.  
שים את קצה המזרק בחלק האחורי של המרווח בין פנים הלחי והחניכיים התחתונות.



### שלב רביעי -

באיטיות לחץ על בוכנת המזרק עד שהבוכנה נעצרת ועסה את מקום ההזרקה על מנת לעודד את הספיגה.  
כמות התמיסה המלאה צריכה לחלחל באיטיות לתוך המרווח בין החניכיים והלחי (חלל הפה).



## **במקרה והמטופל מקיא - אין לתת מנה נוספת של בוקולאם!**

### **תופעות לוואי:**

קשיי נשימה, בחילות והקאות, ישנוניות או ירידה במצב ההכרה.  
במידה וילדך חווה קשיי נשימה יש לפנות באופן מיידי לקבלת סיוע רפואי.

### **אחסון התרופה:**

יש לשים לב לתאריך התפוגה של התרופה ואין להשתמש בה אחרי תאריך זה.  
תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.  
יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-30 מעלות. (לא במקרר או במקפיא!)

### **אזהרות:**

בוקולאם גורמת לישנוניות, שכחה וירידה ביכולת ריכוז וקואורדינציה לכן אין לנהוג, לרכב על אופניים או להפעיל מכונות עד לסיום השפעת התרופה.